

Storm[®]

Wax Block Bait 4_{gr}

Flocoumafen (Φλοκουμαφέν)

Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή κηρωδών κύβων (BB)

Περιεχόμενο: **3** κιλά
σε τεμάχια των **4** γρ.



ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι,
Τηλ.: 210-6860130, www.pestcontrol.basf.gr

 **BASF**
We create chemistry

Εγγυημένη Σύνθεση: flocoumafen: 0,005 % β/β
βοηθητικές ουσίες: 99,995 % β/β

Περιέχει τον πικραντικό – αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium benzoate
χρώμα: μπλε

Τρωκτικοκτόνο δόλωμα έτοιμο προς χρήση
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. • Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής. • Συμβουλευθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
«Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο σε συνεργεία απεντομώσεων - μυσκονιών που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΤΠ14-0061

ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημ. Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημ. Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας



® Σήμα κατατεθέν BASF

**ΑΝΟΙΞΤΕ
ΕΔΩ**



ΧΡΗΣΗ:

Από επαγγελματίες χρήστες κατά των ποντικών και των αρουραίων:

- α) Σε εσωτερικούς χώρους κτιρίων
- β) Σε εξωτερικούς χώρους, γύρω από κτίρια

ΣΤΟΧΟΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΑΜΑΤΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ):

Ποντίκι:

Mus musculus (Ποντίκι) – Ενήλικα και νεαρά άτομα

Αρουραίοι:

Rattus norvegicus (Αρουραίος) – Ενήλικα και νεαρά άτομα

Rattus rattus (Αρουραίος) – Ενήλικα και νεαρά άτομα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Δολωματική εφαρμογή – Περιοδική Δόλωση:

- Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση).

- Καλυπτόμενα και προστατευμένα σημεία δόλωσης (μόνο σε περίπτωση που έχουν το ίδιο επίπεδο ασφαλείας για τα θηλαστικά μη-στόχους και τους ανθρώπους με τους δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας).

- Απευθείας τοποθέτηση δολώματος σε στοές των αρουραίων στο έδαφος (αφορά τη χρήση σε εξωτερικούς χώρους).

ΔΟΣΙΣ ΚΑΙ ΕΥΧΗΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

- Για **Ποντικούς** συνιστάται **δόση** 16 – 32 γραμ. ανά σημείο δόλωσης (αντιστοιχεί σε 8 δολώματα των 4 γρ.). Σε περίπτωση που απαιτείται η χρήση περισσότερων του ενός δολωματικών σταθμών, να τοποθετούνται σε απόσταση 1 έως 2 μέτρων μεταξύ τους.

- Για **Αρουραίους** συνιστάται **δόση** 32-60 γραμ. ανά σημείο δόλωσης (αντιστοιχεί σε 15 δολώματα των 4 γραμ.). Σε περίπτωση που απαιτείται η χρήση περισσότερων του ενός δολωματικών σταθμών, να τοποθετούνται σε απόσταση 5-10 μέτρων μεταξύ τους.

Τεχνική της περιοδικής δόλωσης:

- Επιδεωρνήστε την περιοχή και αντικαταστήστε τα φαγωμένα δολώματα αρχικά μετά από 3 ημέρες και στη συνέχεια κάθε 7 ημέρες.

- Μετακινήστε οποιοδήποτε άθικτο δόλωμα σε χώρους που υπάρχει παρουσία τρωκτικών.

- Σε κάθε επίσκεψη, αντικαταστήστε τα φαγωμένα δολώματα.

- Τοποθετείτε το δόλωμα σε όλη την προσβεβλημένη περιοχή, σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας ή σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης.

- Εάν ο έλεγχος των τρωκτικών δεν επιτευχθεί, ελέγξτε και πάλι το χώρο για να διαπιστώσετε τους λόγους και να εξετάσετε την επανατοποθέτηση ή την αύξηση του αριθμού των σημείων δόλωσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

- Πριν το χρησιμοποίησή τους, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο πώλησης.

- Πριν την έναρξη της εφαρμογής, διενεργήστε επίπονη έλεγχο στην προσβεβλημένη περιοχή ώστε να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τους χώρους δραστηριότητάς τους, καθώς και την πιθανή αιτία και έκταση της προσβολής.

- Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμμένοι σπόροι ή απορριμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίζετε τον μολυσμένο από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας αντιμετώπισης, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά.

- Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στα πλαίσια της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης τρωκτικών (που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατό, φυσικές μεθόδους αντιμετώπισης).

- Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετείται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια, κ.λ.π.).

- Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.

- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση που να δηλώνει ότι περιέχουν τρωκτοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανιχνώνται.

- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχει γίνει εφαρμο-

γή με τρωκτοκτόνα θα πρέπει να επισημαίνονται καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής και να υπάρχει ειδοποίηση που να επειγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντι-πικτικό, ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθετημένων δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και τα μέτρα πρώτων βοηθειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης.

- Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να συρθούν εκτός του δολωματικού σταθμού.

- Τοποθετείτε το προϊόν μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχους.

- Τοποθετείτε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτοτροφές, καθώς και μακριά από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.

- Φοράτε γάντια χημικής προστασίας κατά το στάδιο χειρισμού του προϊόντος ((EN 374, π.χ. ελαστικό νιτρίλιο (0.4 mm), ελαστικό χλωροπυρήνιο (0.5 mm), πολυβινυλχλωρίδιο (0.7 mm) και άλλα).

- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια σας και εξαεθεμένα μέρη του σώματος αμέσως μετά τη χρήση του.

- Η συχνότητα επίσκεψης στις περιοχές εφαρμογής δολωμάτων, εξαρτάται από τον χειριστή, υπό το πρίσμα της έρευνας που έγινε κατά την έναρξη της καταπολέμησης. Η συχνότητα αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις συνστάσεις που παραρτώνται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.

- Εάν η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά είναι χαμηλή σε σύγκριση με το μέγεθος της προσβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινήσετε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλα σημεία και να χρησιμοποιήσετε δολώματα με διαφορετική σύνθεση.

- Εάν μετά από 35 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής, συνεχίσετε ή καταβάλλετε δολώματα και δεν παρατηρείται καμία μείωση στη δραστηριότητα των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία που το προκαλεί. Όταν έχουν αποκλειστεί άλλα αίτια, είναι πιθανόν τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός μη αντιπικτικού τρωκτοκτόνου, όπου υπάρχει, ή ενός ισχυρότερου αντιπικτικού τρωκτοκτόνου. Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης παιγνίων, ως ένα εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.

- Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση ανθεκτικότητας του πληθυσμού-στόχου, όταν επιλέγεται το τρωκτοκτόνο που θα χρησιμοποιηθεί. Στις περιοχές εκείνες που υπάρχουν ενδείξεις ανθεκτικότητας σε συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, αποφεύγετε την χρήση τους. Για τον έλεγχο εξάπλωσης της ανθεκτικότητας, συνιστάται η εναλλαγή δολωμάτων που περιέχουν διαφορετικές αντιπικτικές δραστικές ουσίες.

- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον κάθε 2 ή 3 ημέρες (στην περίπτωση των ποντικών) και κάθε 5 – 7 ημέρες (στην περίπτωση των αρουραίων) αμέσως μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα στη συνέχεια, ώστε να ελεγχθούν οι το δόλωμα έχει καταναλωθεί, αν οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και για να απομακρυνθούν τα νεκρά τρωκτικά. Ανατλήνουν το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

- Απομακρύνετε υπόλοιπο προϊόντος όταν λήξει η περίοδος καταπολέμησης των τρωκτικών.

- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: «να μην μετακινείται και να μην αναλύεται», «περιεχέει τρωκτοκτόνο», «ονομασία προϊόντος ή αριθμός έγκρισης», «δραστική(-ές) ουσία(-ες)» και «σε περίπτωση ατυχήματος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων [Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων 210 77 93 777]».

- Δόλωση σε στοές τρωκτικών: Η τοποθέτηση των δολωμάτων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση σε είδη μη στόχους και στα παιδιά. Καλύψτε ή φράξτε τις εισόδους των δολωμένων στοών, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος απόρριψης και έκχυσης των δολωμάτων.

- Δόλωση σε σκαυολόγια: Μην ανοίγετε τα σκαυολόγια που περιέχουν το δόλωμα.

- Χρησιμοποιήστε μια απόσπυα για μετά την εφαρμογή (καθαρισμός/απόρριψη) δολωμάτων.

Μέτρα μεταρρύθμισης κινδύνου:

- Τα δολώματα πρέπει να εφαρμόζονται με τρόπο που να μην έρχονται σε επαφή με το νερό και να μην ξεπλένονται.

- Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, ρυάκια, οχετοί νερού, χαντάκια, αλάνια άρδευσης) ή συστήματα αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι τα δολώματα δεν έρχονται σε επαφή με το νερό.

- Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους ότι θα γίνει εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].

- Να μην χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ανθεκτικότητας στην δραστική ουσία.

- Τα προϊόντα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάστημα άνω των 35 ημερών χωρίς να

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΠΕΡΓΙΕΣ:

Αυτό το προϊόν περιέχει αντιπικτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, μπορεί να περιλαμβάνουν νινορραγία και αιμορραγία στα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Σε περίπτωση:

- Δερματικής έκθεσης, πλύνετε πρώτα το δέρμα με νερό και στη συνέχεια, με νερό και σαπούνι.

- Οφθαλμικής έκθεσης, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης ματιών ή σέκο νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.

- Στοματικής έκθεσης, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό.

Ποτέ μη χορηγείτε οδιόδητο από το στόμα σε αναίσθητο άτομο. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.

- Αντιόδοτο: Βιταμίνη K1 χορηγούμενη μόνο από ιατρό/κτηνιατρικό προσωπικό.

Τηλέφωνο κέντρου δηλητηρίασης: 210 77 93 777

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδια ζώα, επικαίνωνάστε με κτηνιατρό.

- Επικινδύνει για τα άγρια ζώα.

γίνει αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής. Για λόγους διαχείρισης της ανθεκτικότητας, μην εναλλάσσετε τα αντιπικτικά σκευάσματα με άλλα αντιπικτικά παρόμοιας ή χαμηλότερης ισχύος. Για εναλλαγή χρήσης με άλλα τρωκτοκτόνα, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μη αντιπικτικό τρωκτοκτόνο, εάν υπάρχει, ή ένα ισχυρότερο αντιπικτικό τρωκτοκτόνο.

- Μετάφω των εφαρμογών, μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σύνεργα που χρησιμοποιείτε σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία τοποθέτησης δολωμάτων.

- Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

- Δόλωση σε στοές - Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους ότι θα γίνει εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].

- Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (π.χ. καλύψτε τις σπές, απομακρύνετε πιθανές τροφές και νερό όσο πιο μακριά γίνεται) ώστε να βελτιστοποιηθεί η λήψη των δολωμάτων και να μειωθεί την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια της καταπολέμησης, σύμφωνα με τις συνστάσεις που δίνονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη προσβολής από τρωκτικά ή παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΣΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ:

- Κατά το τέλος της περιόδου καταπολέμησης, απορρίψτε τυχόν δολώματα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

- Μην χρησιμοποιείτε τον περιέκτη για άλλο σκοπό.

ΣΥΝΘΕΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Αποθηκεύστε σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το ηλιακό φως. Αποθηκεύστε σε χώρους στους οποίους δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα. Διάρκεια ζωής προϊόντος: 3 χρόνια. Το προϊόν δεν θα πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες >30 °C.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Λόγω της καθυστερημένης δράσης των αντιπικτικών τρωκτοκτόνων, απαιτούνται 4 έως 10 ημέρες από την καταναλωση του δολώματος από τα τρωκτικά για να υπάρξει αποτελεσματικότητα. Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς νόσων.

Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, κατά την απόρριψή τους. Χρησιμοποιήστε γάντια ή εργαλεία, όπως λαβίδες. Το παρόν προϊόν περιέχει έναν μικροβιολογικό παράγοντα και μια χημική ουσία.

Storm[®]

Wax Block Bait 4_{gr}

Flocoumafen (Φλοκουμαφέν)

Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή κηρωδών κύβων (BB)

Περιεχόμενο: **3** κιλά
σε τεμάχια των **4** γρ.



ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ:
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι,
Τηλ.: 210-6860130, www.pestcontrol.basf.gr

 **BASF**
We create chemistry

Εγγυημένη Σύνθεση: flocoumafen: 0,005 % β/β
βοηθητικές ουσίες: 99,995 % β/β

Περιέχει τον πικραντικό – αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium benzoate
χρώμα: μπλε

Τρωκτικοκτόνο δόλωμα έτοιμο προς χρήση
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. • Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής. • Συμβουλευθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
«Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο σε συνεργεία απεντομώσεων - μυσκονιών που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΤΠ14-0061

ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημ. Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημ. Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας



® Σήμα κατατεθέν BASF

042107α