

 **BASF**

We create chemistry

Nemasys[®] C

Για το βιολογικό έλεγχο προνυμφών
εντόμων γεωργικής σημασίας

- Υψηλή αποτελεσματικότητα, εναρμόνιση με τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (IPM – Integrated Pest Management)
- Εντομοπαθογόνοι νηματώδεις του είδους *Steinernema carrocapsae* (87%) και αδρανές υλικό και νερό (13%)
- Συμβατό στη βιολογική γεωργία



Nemasys[®] C

Εντομοπαθογόνοι νηματώδεις για το βιολογικό έλεγχο:

- της καρπόκαψας της μηλιάς (*Cydia pomonella*) και της ροδακινιάς (*Grapholita molesta*)
- του σκαθαριού των πεύκων (*Hylobius abientis*) διάφορων ειδών κάμπιας (οικ. *Noctuidae*), συμπεριλαμβανομένων των: *Spodoptera* spp., άλτης της τομάτας (*Chrysodeixis chalcites*), Μαμέστρα (*Mamestra brassicae*), Κάμπια των πεύκων (*Duponchelia fovealis*)
- του κρεμμυδοφάγου (*Gryllotalpa gryllotalpa*)
- της υδρέλιας (*Hydrelia griseola*)
- του κόκκινου σκαθαριού/ρυγχοφόρου (*Rhynchophorus ferrugineus*) των φοινικοειδών και της πεταλούδας (*Paysandisia archon*) των φοινικοειδών



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

50, 250, 500 εκατομμύρια και 1,5 δισεκατομμύριο νηματώδεις

ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Έντομο-στόχος	Λατινική ονομασία	Δόση εφαρμογής (σε νηματώδεις)	Μεσοδιάστημα εφαρμογών	Όγκος εφαρμογής
ΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΔΑΦΟΥΣ				
Άλτης	<i>Chrysodeixis chalcites</i>	500.000 ανά τ.μ.	5-7 ημ. ή 7-14 ημ.	0,3 λίτρα / τ.μ.
Καρπόκαψα της Μηλιάς	<i>Cydia pomonella</i>	150.000 ανά τ.μ.	-	0,15 λίτρα / τ.μ.
Καρπόκαψα της Ροδακινιάς	<i>Grapholita molesta</i>	150.000 ανά τ.μ.	-	0,15 λίτρα / τ.μ.
Κρεμμυδοφάγος	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	500.000 ανά τ.μ.	-	0,3 λίτρα / τ.μ.
Μαμέστρα	<i>Mamestra brassicae</i>	500.000 ανά τ.μ.	5-7 ημ. ή 7-14 ημ.	0,3 λίτρα / τ.μ.
Κάμπια των Πεύκων	<i>Duponchelia fovealis</i>	500.000 ανά τ.μ.	5-7 ημ. ή 7-14 ημ.	0,3 λίτρα / τ.μ.
Σκαθάρι των Πεύκων	<i>Hylobius abientis</i>	500.000 ανά τ.μ.	5-7 ημ. ή 7-14 ημ.	0,3 λίτρα / τ.μ.
Σποντόπτερα/Κάμπια	<i>Spodoptera</i> spp.	500.000 ανά τ.μ.	5-7 ημ. ή 7-14 ημ.	0,3 λίτρα / τ.μ.
Υδρέλια	<i>Hydrelia griseola</i>	500.000 ανά τ.μ.	5-7 ημ. ή 7-14 ημ.	2 λίτρα / τ.μ.
ΔΙΑΒΡΟΧΗ ΚΟΡΜΟΥ				
Κόκκινο σκαθάρι / ρυγχοφόρος των Φοινικοειδών	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i>	25 εκατομμύρια / δέντρο	κάθε 6-8 εβδομάδες μία (1) εφαρμογή	20 λίτρα / φοίνικα
Πεταλούδα των Φοινικοειδών	<i>Paysandisia archon</i>	25 εκατομμύρια / δέντρο	κάθε 6-8 εβδομάδες μία (1) εφαρμογή	20 λίτρα / φοίνικα
ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΦΥΛΩΜΑΤΟΣ				
Άλτης	<i>Chrysodeixis chalcites</i>	500.000 ανά τ.μ.	5-7 ημ. ή 7-14 ημ.	0,1 λίτρα / τ.μ.
Μαμέστρα	<i>Mamestra brassicae</i>	500.000 ανά τ.μ.	5-7 ημ. ή 7-14 ημ.	0,1 λίτρα / τ.μ.
Κάμπια των Πεύκων	<i>Duponchelia fovealis</i>	500.000 ανά τ.μ.	5-7 ημ. ή 7-14 ημ.	0,1 λίτρα / τ.μ.
Σκαθάρι των Πεύκων	<i>Hylobius abientis</i>	500.000 ανά τ.μ.	5-7 ημ. ή 7-14 ημ.	0,1 λίτρα / τ.μ.
Σποντόπτερα/Κάμπια	<i>Spodoptera</i> spp.	500.000 ανά τ.μ.	5-7 ημ. ή 7-14 ημ.	0,1 λίτρα / τ.μ.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Με ψεκασμό στο φύλλωμα:

1. Εφαρμόστε από την πρώτη παρουσία του φυτοφάγου.
2. Εφαρμόστε κατά τις βραδινές ώρες ή σε σκιά.
3. Ο όγκος διαλύματος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 100 λίτρα υγρού/στρέμμα, ώστε να μην υπάρχει απορροή. Η απορροή συντελεί στην απομάκρυνση των εντομοπαθογόνων νηματωδών από το φύλλο με συνέπεια να μειώνεται η αποτελεσματικότητα.
4. Ανάλογα με την έκταση της προσβολής, επαναλάβετε την εφαρμογή κάθε 5-7 ή 7-14 μέρες.



Με διαβροχή στο έδαφος:

1. Εφαρμόστε από την πρώτη παρουσία του φυτοφάγου.
2. Εφαρμόστε κατά τις βραδινές ώρες ή σε σκιά.
3. Διαβρέξτε ελαφρώς το έδαφος πριν την εφαρμογή.
4. Διατηρήστε την υγρασία του εδάφους για δύο εβδομάδες μετά την εφαρμογή.
5. Ο όγκος διαλύματος πρέπει να είναι 300 λίτρα υγρού / στρέμμα ώστε οι εντομοπαθογόνοι νηματώδεις να διεισδύσουν σε βάθος και να μπορούν να κινηθούν προς τις προνύμφες των λεπιδοπτέρων. Ανάλογα με την έκταση της προσβολής, επαναλάβετε την εφαρμογή κάθε 5-7 ή 7-14 μέρες



Διαβροχή κορμού (Φοινικοειδή)

1. Εφαρμόστε από την πρώτη παρουσία του φυτοφάγου
2. Εφαρμόστε κατά τις βραδινές ώρες ή σε σκιά.
3. Εφαρμόστε απευθείας σε όλες τις κάμπιες.
4. Όγκος διαλύματος: 20 λίτρα / φοίνικα, ώστε να μην υπάρχει απορροή.
Η απορροή συντελεί στην απομάκρυνση των εντομοπαθογόνων νηματωδών από το φύλλο με συνέπεια να μειώνεται η αποτελεσματικότητα.
5. Ανάλογα με την έκταση της προσβολής, μπορεί να χρειαστείτε μία (1) μόνο εφαρμογή ή να επαναλάβετε την εφαρμογή κάθε 6-8 εβδομάδες.

Αντιμετωπίστε αυτό τα παραπάνω παράσιτα μεταξύ των μηνών

- Άλτης, Μαμέστρα, Κάμπια των Πεύκων, Σκαθάρι των Πεύκων, Σποντόπτερα/Κάμπια, Κρεμμυδοφάγος
- Κόκκινο σκαθάρι /ρυγχοφόρος των Φοινικοειδών, Πεταλούδα των Φοινικοειδών
- Καρπόκαψα της Μηλιάς

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Μακριά από παιδιά, τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.
- Μην χρησιμοποιείτε προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης του ή εάν δεν έχει αποθηκευτεί σωστά.
- Δεν είναι συμβατό με νηματωδοκτόνα.
Για περισσότερες πληροφορίες για συμβατότητα με φυτοπροστατευτικά σκευάσματα επικοινωνήστε μαζί μας.
- Το προϊόν αφού ανοιχτεί θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξ' ολοκλήρου και άμεσα σε μία εφαρμογή. Να μην αποθηκεύετε μέρος του προϊόντος αφού έχει ανοιχθεί ή αφού έχει αναμειχθεί με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Αποθηκεύεται στο ψυγείο (5 °C). Το προϊόν παραμένει σταθερό στις προτεινόμενες συνθήκες για 12 εβδομάδες.

ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΤΑΨΥΞΕΤΕ.

Οι εντομοπαθογόνοι νηματώδεις είναι ακίνδυνοι για τα κατοικίδια ζώα, τα πτηνά, τα ερπετά και τα θηλαστικά.

Οι οδηγίες που αναφέρονται στο παρόν, είναι γενικές και δεν υποκαθιστούν την ετικέτα του προϊόντος. Ακολουθείτε πάντα την ετικέτα του προϊόντος. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με τη BASF.



Professional & Specialty Solutions

Ο τομέας προϊόντων Δημόσιας Υγείας και Εξειδικευμένων Εφαρμογών (Professional & Specialty Solutions), προσφέρει ειδικά καινοτόμα προϊόντα που περιέχουν ωφέλιμους (εντομοπαθογόνους) νηματώδεις στις εμπορικές επωνυμίες Nemasys® και Nemaslug®

www.pestcontrol.basf.gr



Χώρος σφραγίδας

Το Nemasys® και το Nemaslug® είναι σήμα κατατεθέν της BASF.

Παράγεται από την:

BASF Agricultural Specialities Limited
Harwood Industrial Estate
Harwood Road, Littlehampton
West Sussex, BN17 7AU, Reino Unido
Tel: +44 1903 732323
Fax: +44 1903 732266

Υπεύθυνος για τη διάθεση του σκευάσματος στην αγορά:

BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι
Τηλ. κέντρο: 210 68 60 100, Fax: 210 68 60 200
e-mail: pestcontrol-basf-gr@basf.com

Ημερ. Έκδοσης: Δεκέμβριος 2020

